

Sastago B

Tamaño: Pequeño.

Forma: Asimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado en toda su longitud.

Zona pistilar: Bien centrada o ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado con el **punto pistilar** aprisionado dentro de la sutura. En algún fruto el ápice es acuminado.

Sutura: Oprimida y con surco muy estrecho. Hendida en la cavidad peduncular y en el ápice. La sutura se prolonga en la cara dorsal, siendo en esta parte ancha y rebajada.

Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media.

Piel: Velloso, de pubescencia muy abundante y de aspecto lanoso. **Color:** Domina el amarillo anaranjado del fondo con punteado del mismo tono pero algo más claro. La chapa es rojo ciclamen, formada por punteado más o menos compacto, de aspecto marmóreo, que cubre desde una cuarta parte de la superficie hasta la mitad de ésta, pero sólo en zonas muy pequeñas no deja transparentar el fondo.

Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso (algún fruto está suavemente teñido). Suave, jugosa, muy dulce y aromática. **Sabor:** Muy bueno.

Hueso: Adherente a la carne, tamaño variable, pequeño y muy pequeño, forma alargada con tendencia a globosa. Superficie medianamente áspera, muy esculpida, con surcos largos, anchos y profundos. Algún orificio sólo en la zona peduncular. Polo peduncular cerrado.

Maduración: Primera y segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

